

Lobopodia

De **Lobopodia** vormen een groep binnen de Ecdysozoa, bestaande uit wormachtige dieren met flexibele, niet-gesegmenteerde ledematen.

De naam wordt vooral gebruikt om een aantal (vroeg-)Paleozoïsche geslachten te ordenen, met name *Aysheaia* en *Hallucigenia*, maar de precieze omvang varieert. In de grootste omvang omvat het alle Panarthropoda met uitzondering van de Euarthropoda (de kroongroep van Arthropoda), en worden dan dus ook uitgestorven vormen als *Opabyinia* en *Anomalocaris* zowel als de nog levende Tardigrada en Onychophora onder de Lobopodia gerekend. In de cladistiek wordt de aanduiding niet gebruikt omdat de groep waarschijnlijk paraphyletisch is: sommige Lobopodia staan dichterbij de Arthropoda dan bij andere Lobopodia.



Reconstructie van *Aysheaia*

Overgenomen van "<https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lobopodia&oldid=47153622>"

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 jul 2016 om 09:59.

De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.
Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk.